

Doknr. i Barium 19088	Dokumentserie su/med	Giltigt fr o m 2020-11-12	Version 15
<b>RUTIN</b> Preoperativa förberedelser vid transplantation av kombinerad njure-pankreas och singelpankreas			
Innehållsansvarig: Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13) Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10) Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum			

Åtgärd	Datum	Sign
Välkomstbroschyr. Ankomstsamtal enligt SBAR		
Se om upprättad vårdplan finns (se under fri aktivitet) och flytta denna till aktuellt vårdtillfälle.		
Längd, vikt, blodtryck, puls, temp, POX, EKG. Provtagning enligt lista nedan		
Hjärt- lungröntgen (med preliminärsvär) beställs av pat. koord innan inläggning		
Läkarundersökning/inskrivning/ordinationer (immunsuppression, antibiotikaprofylax, analgetika)		
Samtal och sidomarkering kirurg		
Kontrollera att patienten har CDK alternativt AV-fistel		
Immunadsorbtiionsbehandling (IA-behandling) nr 1 inplanerad		
IA-behandling nr 2 inplanerad		
IA-behandling nr 3 inplanerad		
IA-behandling nr 4 inplanerad		
IA-behandling nr 5 inplanerad		
IA-behandling nr 6 inplanerad		
Eventuella dialysbehandlingar inplanerade: _____		
Skall patienten delta i en studie? Om ja, namnet på studien: _____		
Kontrollera att journalen är komplett: (Svar blodgrupp, crossmatch i CDC och FC, hepatitserologi, hjärt-lungröntgen)		
Sjukgymnast preoperativ information		
Narkosbedömning på preop center (mån-tor 9–11.15, 13–15.30, fre 9-11.15)		
Påbörja anteckning "Vårdavdelning" i Orbit		
CVK remiss (diabetiker, svårstuckna), endast på läkarordination. Skriv ut och skicka med till operation		
Dela preoperativa läkemedel till operationsdagens morgon		

Operationsdagens morgon		
Na, K, Krea (4 ml gel) <b>Aktumärk</b> (OBS! läkarkontakt vid S-Kalium >5mmol/L)		
Anti A titer/Anti B titer, (3 ml EDTA) <b>Aktumärk. Lämna på blodcentralen! OBS! Meddela svar till ansvarig njurmedicinläkare innan transport till op.</b>		
Vikt, blodtryck, puls, temp, POX		
Stödstrumpor. Kontrollera att sidomarkering finns		
Peritonealdialyspatient: Tappa ut dialysvätska i tompåse		

Doknr. i Barium 19088	Giltigt fr.o.m 2020-11-12	Version 15
--------------------------	------------------------------	---------------

# RUTIN

## Preoperativa förberedelser vid transplantation av kombinerad njure-pankreas och singelpankreas

<b>Peroral</b> antibiotikaproylax ges på avdelningen 1 timma före operation. Se läkemedelsmodulen.		
<b>Intravenös</b> antibiotikaproylax och <b>intravenös</b> immunsuppression skickas med till operation. Se läkemedelsmodulen.		
<b>PROVTAGNING</b> <b>Patienter som ska ha ABO-behandling:</b> Skicka med provlappar till dialysen, så tar de proverna. <b>Patienter som INTE ska ha ABO-behandling:</b> Prover tas på 139	Datum	Sign
Hb, LPK, TPK (3 ml EDTA) <b>Akutmärk</b>		
APTT, PK (5 ml citrat) <b>Akutmärk</b>		
Na, K, Ca, Crp, Krea, ASAT, ALAT, Alp, Bil, Prot, Alb, Urea, Fosfat, PTH, <b>Akutmärk</b> (OBS! läkarkontakt vid S-Kalium >5mmol/L)		
Glukos, Standardbikarbonat (3 ml OxF) <b>Akutmärk</b>		
HBsAg, anti HBs, anti HBc IgG, anti-HCV, HIV-serologi (10 ml Serum) <b>Akutmärk</b> Lab etikett: Sökväg: HIV-Hepatitisserologi		
Ca jon (4 ml gel,) <b>Akutmärk</b> Skriv på labbestrems: <b>Före</b> ABO-behandling. Skriv på labbestrems: <b>Efter</b> ABO-behandling.		
Anti A titer/Anti B titer, (3 ml EDTA) <b>Akutmärk. Lämna på blodcentralen!</b> Remiss transfusionsmedicin. Skriv på remiss och rör: <b>Före</b> ABO-behandling. Skriv på remiss och rör: <b>Efter</b> ABO-behandling.		
HbA1c (om diabetiker) (3 ml EDTA)		
Virusserologi: CMV <b>IgG</b> , EBV <b>IgG</b> , HSV-1 <b>IgG</b> , HSV-2 <b>IgG</b> , Varicella <b>IgG</b> (10 ml Serum) Lab etikett: Sökväg: Allmänserologi → Annat specificerat önskemål → agens		
Biobank: Beställning i LabBest: 0 PTXL-Vuxen Blodprov - Ett 10 ml ACD-A rör (för lymfocyter) - Ett 10 ml Serumrör - Ett 6 ml Plasma-EDTA rör.		
Blodgruppering (om den inte finns på SU) (6 ml EDTA) Remiss transfusionsmedicin		
Bastest (6 ml EDTA) Remiss transfusionsmedicin		
Studieprover? (enl specifikt studie-PM)		
<b>OBS! För patienter med inläggning dag – 3, tas vid inläggning:</b> Mykofenolsyra (MPA-AUC) (3 ml EDTA) Provtagning kl 08.00, (ge läkemedlet) 08.30, 10.00		
<b>Övriga dagar innan transplantation</b>		
Ta fram "Provtagning före och efter ABO-inkompatibel njurtransplantation, dag -3 / dag -7". Se Barium		