

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Giltig från: 2022-09-28

Giltig till: 2024-09-19

Eliquis vid förmaksflimmer

Syftet med Eliquis (apixaban) är att minska din risk att få stroke. Vid förmaksflimmer kan blodproppar bildas i hjärtat. Om de lossnar kan de via blodbanan föras till hjärnan och täppa till ett blodkärl och därmed ge stroke. Eliquis gör att blodproppar inte bildas så lätt och minskar därför risken för stroke.

Så tas Eliquis

Eliquis ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. För att lättare komma ihåg Eliquis bör du försöka ta tabletterna i samband med något som du alltid brukar göra två gånger om dagen.

Den vanliga dosen är 5 mg två gånger om dagen. Vissa patienter ordinerar av olika skäl styrkan 2,5 mg två gånger om dagen.

Du ska svälja tabletten med ett glas vatten och kan ta den med eller utan mat. Tabletten kan krossas om du har svårt att svälja. Den kan också tas ur förpackningen och läggas i en dosett.

**Det är viktigt att du inte glömmar att ta medicinen.
Ingen tablett = inget skydd!**

Behandlingen ges oftast tills vidare. Sluta inte att ta Eliquis utan att först diskutera med din läkare!

Bär din bricka om halsen alternativt ha med ditt behandlingskort som anger att du tar Eliquis. Den är till för din säkerhet om det t ex skulle ske en olycka och sjukvårdspersonal snabbt behöver veta att du tar Eliquis.

Kontroller

Det behövs inte några speciella prover för att bedöma effekten av Eliquis. Däremot måste njurfunktionen kontrolleras med blodprov, kanske var 6:e eller var 12:e månad eftersom Eliquis inte ska användas vid kraftigt nedsatt njurfunktion.

Biverkningar

Eliquis minskar blodets levringsförmåga och därför finns en ökad risk för blödningar.

Andra mediciner och operationer

Berätta alltid om dina andra mediciner inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t ex johannesört). Vissa medel kan störa verkan av Eliquis och antingen ge ökad risk för blödning eller sämre effekt av behandlingen.

Berätta alltid att du tar Eliquis om du ska få en ny medicin.

Receptfria läkemedel som acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl med flera) och antiinflammatoriska läkemedel (Ipren, Brufen, Naproxen, Diklofenak med flera) kan ge en ökad risk för blödning och bör inte tas tillsammans med Eliquis.

Paracetamol (Alvedon, Panodil med flera) går bra att använda tillsammans med Eliquis.

Meddela också att du har Eliquis om du ska genomgå operationer, biopsi eller tandläkarbehandling. Man kan behöva göra ett uppehåll med Eliquis inför en sådan åtgärd.

Mat och dryck

Du kan äta som vanligt med Eliquis. Mat påverkar inte effekten av behandlingen. Måttligt intag av alkohol är också tillåtet.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den glömda tabletten så fort du kommer på det om det är mer än 6 timmar kvar tills du ska ta nästa dos. Om det är mindre än 6 timmar kvar, invänta nästa planerade dos och ta den som vanligt. Ta **aldrig** dubbel dos för att kompensera missad tablett.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis?

Då kan det finnas en risk för blödningar. Kontakta sjukvården för råd (tfn 1177). Om du har en allvarlig blödning, ring 112.

Kontaktuppgifter

Broschyren är framtagen av processteamet Att vårda patienter med hjärtrytmrubbningar.

Ansvarig: Björn Fredriksson, överläkare/processledare
Telefon: Södra Älvsborgs Sjukhus 033 – 616 10 00

Fler tips på nätet

Blodproppsskolan: www.blodproppsskolan.se

STROKE-riksförbundet: www.strokeforbundet.se

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: www.hjart-lung.se

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation, referensexemplar

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Granskad av: Björn Fredriksson, (bjofr), Överläkare

Godkänd av: Sara Degerman Carlsson, (sarde), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-33

Version: 5.0

Giltig från: 2022-09-28

Giltig till: 2024-09-19