

NT-rådets rekommendation avseende Mylotarg för behandling av akut myeloid leukemi (AML)

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Mylotarg (gemtuzumabozogamicin) i kombination med daunorubicin och cytarabin bör användas för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv AML med fördelaktig cytogenetisk riskprofil, undantaget akut promyelocytleukemi (APL).

Vidare anges i rekommendationen att Rydapt (midostaurin) är ett alternativ för gruppen som är FLT3-positiva.

Frågan om ordnat införande och eventuell introduktionsfinansiering i VGR är ännu inte behandlad i regionens berednings- och beslutsprocess. En användning i enlighet med NT-rådets rekommendation fram till beslut i VGR diskvalificerar inte för att ingå i regionens process. Behandlande enhet står för läkemedelskostnaden fram till beslut.

NT-rådets rekommendationer finns samlade på janusinfo.se.

Anna Lindhé
Västra regionens representant i NT-rådet
anna.lindhe@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
Läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- Sjukhusförvaltningarnas representanter i Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter
- RCC väst – för vidaredistribution till berörda processägare
- Regionalt programområde Cancersjukdomar
- Terapigrupp Onkologi

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev