

# Informacije za pacijente

losartan	Cozaar/Comp, Klomentan/Comp, Losarstad/Comp, Losartan, Losatrix, Losartan/Hydrochlorothiazide, Losartan/hydroklortiazid, Marozid
eprosartan	Teveten/Comp
valsartan	Diovan/Comp, Valsartan, Valsartan/hydrochlorothiazide, Valsartan/Hydroklortiazid Valsartore/Comp, Valtsu/Comp, Exforge, Entresto
irbesartan	Aprovel, CoAprovel, Ifirmasta, Ifirmacombi, Irbesartan, Irbesartan/hydrochlorothiazid, Karvea
kandesartan	Atacand/Plus, Candemox Comp, Candesarstad/Comp, Candesartan, Candesartan/Hydrochlorothiazid, Candexetil/Comp, Kairasec, Kandrozid,
telmisartan	Micardis/Plus, Lesamor, Telmisartan/Hydroklortiazid, Tolura, Tolucombi
<b>Lijekove za liječenje dijabetesa</b>	
metformin	Metformin, Comptact, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentaduetto, Komboglyze, Synjardy, Vokanamet, Xigduo
empagliflozin	Jardiance, Synjardy, Glyxambi
kanagliflozin	Invokana, Vokanamet
dapagliflozin	Forxiga, Xigduo, Qtern
ertugliflozin	Steglatro, Segluromet, Steglujan
<b>Druge lijekove</b>	

Lijekovi protiv bolova u obliku gela ili spreja se slobodno mogu koristiti. Tablete i tečni lijekovi sa paracetamolom (Alvedon, Pamol, Panodil, Paracetamol, Paracut, Pinex, Quramol, Theremin) se takođe mogu koristiti.

## Nikada ne prelazite preporučene doze!

Napravila Terapijska grupa za Starije i lijekove avgust 2018. g., verzija 2

## Vama koji uzimate

### LIJEKOVE

**koji nose veliki rizik od ozbiljnih nuspojava pri akutnim stanjima kod dehidracije**

- *proljev*
- *povraćanje*
- *visoka temperatura (preko 38 °C)*
- *val vrućine*
- *akutna bolest sa teškoćama da se jede ili pije*

Neki od lijekova koji se koriste za liječenje srčanih oboljenja, visokog pritiska, bolova i dijabetesa mogu dovesti do ozbiljnih nuspojava ukoliko se koriste kada je balans tekućine u tijelu poremećen.

**Zapamtite:**

*Postoji rizik za ozbiljne nuspojave ovih lijekova u slučaju dehidracije kao što su povraćanje, proljev, povišena temperatura, visoka toplota ili stanja koja čine da ne možete jesti ili piti.*

*Rizik za ozbiljne nuspojave se povećava s godinama ili kod smanjene funkcije bubrega.*

**Kako reagirati u slučaju dehidracije?**

Ako uzimate neke od gore navedenih lijekova, trebate napraviti pauzu u Vašem liječenju u situacijama u kojima može doći do dehidracije. Ako tegobe prestanu, liječenje se ponovo može nastaviti direktno nakon prestanka tegoba.

**Obratite se zdravstvenim ustanovama ukoliko ste nesigurni!**

.....

**Ako uzimate sljedeće lijekove:**

<b>Lijekove protiv bolova (analgetike)</b>	
diklofenak	Diclofenak/T, Dicuno, Diklofenak/T, Eeze, Eezeneo, Ignorin, Voltaren/T, Arthrotec/forte
piroxikam	Brexidol
tenoxicam	Alganex
meloxicam	Meloxicam
ibuprofen	Brufen/retard, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ifenin, Ipren, Nurofen Apelsin
naproxen	Alpoxen, Naprocur, Naprosyn Entero, Naproxen, Pronaxen, Vimovo
ketoprofen	Orudis/Retard
dexibuprofen	Tradil
dexketoprofen	Enantyum, Kettese
celecoxib	Celebra, Celecoxib
etoricoxib	Arcoxia, Turox
nabumeton	Relifex
<b>Lijekove za izlučivanje tekućine (diuretike)</b>	
bendroflumetiazid	Bendroflumetiazid, Salures, Centyl K/mite
hidroklortiazid	Esidrex, Hydrochlorothiazide, Hidroklortiazid
klortalidon	Hygropax
metolazon	Metolazon
furosemid	Furix/Retard, Furosemid, Impugan, Lasix Retard
bumetanid	Burinex
torasemid	Torasemid, Torem
spironolakton	Spirolactone, Spironolakton
eplerenon	Eplerenon, Inspra
amilorid	Amilorid
<b>Lijekove za liječenje srčanih bolesti i povišenog pritiska</b>	
digoxin	Digoxin, Lanoxin
kaptopril	Captopril
enalapril	Enalapril, Renitec, Enalapril Comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide, Linatil Comp, Linatil Comp Mite, Renitec Comp
lisinopril	Lisinopril, Zestril, Lisinopril/Hydrochlorotiazid
perindopril	Coversyl Novum
ramipril	Ramipril, Triatec, Ramipril/Hidroklortiazid
fosinopril	Fosinopril
kinapril	Accupro Comp