

Vaccination mot TBE 2021

Information till sjukvårdspersonal

OBS!

Vaccination mot TBE kan ske även om det pågår smittspridning av covid-19 men var noga med att ha rutiner för att minimera risken för smittspridning och att skapa möjligheter för de som ska vaccineras så att de kan följa de allmänna rekommendationerna.

Vaccination

Det finns vaccin med god skyddseffekt. En fullständig grundvaccination omfattar normalt tre injektioner. De två första ges med *minst* en månads intervall, lämpligen så att andra dosen hinner ges senast i mars-april före fästingsäsongen. Dessa två vaccinationer ger ett hyggligt skydd, men varar bara en säsong. Därför behövs en tredje dos för att förlänga och förbättra skyddet. Denna ges minst fem månader efter dos två och lämpligen i god tid inför nästföljande vår. Skyddet kvarstår sedan i minst tre år. Om smittrisen kvarstår, bör en fjärde dos ges efter tre år och ytterligare påfyllnadsdoser (boosterdoser) därefter vart femte år.

TBE-vaccin kan ges till barn från 1 års ålder enligt samma schema, se nedan.

Personer som fyllt 50 år när vaccinationen påbörjas, eller som har nedsatt immunförsvar, kan få ett sämre skydd och rekommenderas en tredje dos minst två månader efter dos två. En fjärde dos bör därefter ges minst fem månader efter dos tre inför nästa fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen. Påfyllnadsdoser ges enligt samma schema som för yngre vuxna och barn.

Om en person som redan fyllt 50 år inte har fått extradosen första året, kan man istället lägga till en extradosa minst 1–2 månader efter dos tre eller fyra. Efter fem givna doser behövs inga extradoser, utan personen kan gå in i ordinarie schema med påfyllnad vart femte år.

Graden av nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömas i varje enskilt fall och eventuellt i samråd med personens behandlande läkare. Det gäller till exempel vid malignitet och inflammatorisk systemsjukdom.

Smittskydd Västra Götaland

Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 010 – 441 24 31
Fax 033 – 10 04 92

Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Tfn 010 – 441 24 00
Fax 031 – 13 37 95

Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde
Tfn 010 – 441 24 27
Fax 0500 – 43 24 99

Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tfn 010 – 441 24 23
Fax 0522 – 131 82

E-post
smittskydd@vregion.se
Hemsida
www.vregion.se/smittskydd

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska yngre personer kan gå in i schemat oavsett intervall till föregående dos/doser och behöver aldrig ”börja om”. För dem över 50 år och dem med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Risken för svår TBE-sjukdom är ökad i denna grupp, samtidigt som det immunologiska svaret på vaccin kan vara sämre. Detta gör att man ska vara liberal med att ”börja om” om det gått mer än ett år sedan *första* dosen.

Utbytbart av vacciner: Helst bör samma vaccin användas till de två första doserna (de tre första för dem > 50 år) i grundvaccinationsschemat. Dosen inför nästa fästingsäsong och följande boosterdosor kan ges med olika vacciner.

Snabbvaccinationsschema är i normalfallet inte nödvändigt.

Personer som vill vaccinera sig behöver inte avrådas. Biverkningsfrekvensen är låg. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla.

Det upphandlade vaccinet i Västra Götalandsregionen 2021 är FSME-IMMUN från Pfizer. Vaccinationen betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.

TBE-vaccination rekommenderas till:

- Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk.
För smittrisk i övriga Sverige, se respektive smittskyddsenhets lokala rekommendationer.
- Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk.
- Resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.

Vaccinationsrekommendationen är mindre angelägen för:

- Personer som endast kortvarigt vistas i områden med smittrisk
- Personer bosatta i riskområde men som inte brukar vistas i skog och mark

Om en person insjuknat i TBE är det viktigt att familj och andra anhöriga, som vistas i samma område som patienten blivit smittad, vaccineras mot TBE.

Smittskydd Västra Götaland

Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 010 – 441 24 31
Fax 033 – 10 04 92

Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Tfn 010 – 441 24 00
Fax 031 – 13 37 95


Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde
Tfn 010 – 441 24 27
Fax 0500 – 43 24 99

Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tfn 010 – 441 24 23
Fax 0522 – 131 82

E-post
smittskydd@vgregion.se
Hemsida
www.vgregion.se/smittskydd

Schema TBE – grundvaccination

Grundvaccination < 50 år



Grundvaccination > 50 år eller kraftig immunsöndring



Schema TBE-vaccination boosterdos

Efter genomgången grundvaccination gäller samma intervall för boosterdos oavsett ålder och immunstatus.



Fortsatt vaccination var 5:e år om risken för TBE kvarstår.

Bilder: Gunilla Ockborn

Smittskydd Västra Götaland

Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 010 – 441 24 31
Fax 033 – 10 04 92

Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Tfn 010 – 441 24 00
Fax 031 – 13 37 95

Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde
Tfn 010 – 441 24 27
Fax 0500 – 43 24 99

Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tfn 010 – 441 24 23
Fax 0522 – 131 82

E-post
smittskydd@vgregion.se

Hemsida
www.vgregion.se/smittskydd