


Koloskopi



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
KUNGÄLVS SJUKHUS

Vad är koloskopi?

Koloskopi är en undersökning av tjocktarmen med hjälp av en böjlig slang (koloskop) som förs in via ändtarmen.

Vid koloskopi undersöker man hela tjocktarmen och ibland även nedre delen av tunntarmen. Undersökningen visar om slemhinnan är inflammerad eller om det finns polyper, tumörer eller fickor på tarmen. Det går också att ta vävnadsprover vid undersökningen samt ta bort polyper.

Tjocktarmen måste vara helt ren vid undersökningstillfället: dels blir undersökningen lättare att genomföra då, dels är det lättare att bedöma slemhinnan. I annat fall kan laxeringen och undersökningen behöva göras om.

Undersökningen

Medan undersökningen pågår ligger du ned på vänster sida. Ändtarmsöppningen bedövas med bedövningsgel. Instrumentet förs in via ändtarmen, samtidigt blåser man via instrumentet in koldioxid för att vidga tarmen vilket kan upplevas som obehagligt. För att minska dina besvär kan du få syrgas, smärtstillande, lugnande medel och dropp. Undersökningen tar oftast 15–30 minuter, men kan ta längre tid i vissa fall.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du känna dig spänd och uppblåst. Det kan också hända

att du får magknip på grund av koldioxiden, men obehagen försvinner allt eftersom. Du kan äta och dricka som vanligt efter undersökningen.

När undersökningen är klar får du ligga kvar en stund på vår uppvakningsavdelning, beroende på hur mycket lugnande mediciner du fått.

Eftersom lugnande medel ger en nedsatt reaktionsförmåga ska du inte köra bil det närmaste dygnet.

Uppföljning

Du kommer att få svar på undersökningen av din läkare; antingen per brev, telefon eller vid ett återbesök.

Kungälvssjukhus, 442 83 Kungälv
Besöksadress:
Lasarettsgatan, Kungälv
Tfn 0303-980 00
www.vgregion.se/ks