




Pediatri • Barnmedicin

Tuberkuloza latente

Latent tuberkulos



Namn Emri

	Je infektuar me bakterie tuberkuloze. Tuberkuloza është një infektion shumë i rëndomtë në botë. Du har blivit smittad av tuberkulosbakterier. Tuberkulos är en mycket vanlig infektion i världen.
	Ti ke diçka që quhet tuberkuloza latente. Kjo d.m.th. se i ke bakteriet në trup por janë joaktive. Ti nuk je i sëmurë dhe nuk mund ta infektosh dikë tjetër. Du har det som heter latent tuberkulos. Det innebär att du har bakterierna i kroppen men de är vilande. Du är inte sjuk och du kan inte smitta någon annan.
	Ekziston rreziku që sëmundja të shpërthejë më vonë, dhe ajo mund të bëhet shumë serioze. Prandaj të rekomandojmë ta marrësh trajtimin kundër tuberkulozës gjatë tre muajshë. Det finns risk att sjukdomen bryter ut senare, och den kan då bli allvarlig. Därför rekommenderar vi att du genomför behandlingen mot latent tuberkulos under tre månader.
	Mund të jetosh si zakonishtë dhe të ushtrosh, të shkosh në shkollë dhe ti takosh shokët gjatë trajtimit. Du kan leva som vanligt och träna, gå i skolan och träffa kompisar under behandlingen.

Pediatri · Barnmedicin

Trajtim

Behandling

	Ti do t'i marrësh ilaçet e mëposhtme: Du ska ta följande mediciner: Tibinidemg tablett en gång varje dag/ tabletë një herë në ditë
	Rimactanmgkapsel en gång varje dag/ kapsulë një herë në ditë
	Duhet të marrësh medikamente cdo mëngjes. Prit së paku një orë para se të hash mëngjes. Du ska ta mediciner varje morgon. Vänta minst en timme med frukost.
	Është shumë me rëndësi të të kujtohen medikamentet. Nëse i harron mund të ndodhi që bakteriet të bëhen më pak të ndieshme ndaj medikamenteve. Det är mycket viktigt att komma ihåg medicinen. Om man glömmer kan bakterierna bli mindre känsliga för medicinerna.
	Tabletat mund ti marrësh mes orës 6 dhe 10. Pa marrë parasysh kur i merr ti duhet gjithëmonë të pritësh së paku një orë për të ngënë mëngjes. Du kan ta tabletterna någon gång mellan kl. 6 och 10. Oavsett när du tar dom måste du alltid vänta minst 1 timme med frukost.

Pediatri • Barnmedicin

Informata mbi efektet anësore

Information om biverkningar

	Medikamentet i japin ngjyrë të kuqe/portokalli urinës. Nuk është rrezik. Medicinerna färgar urinen röd/orange. Det är ofarligt.
	Mund të ndiesh lodhje, dhimbje stomaku dhe të kesh mundim. Këto telashe zakonisht kalojnë. Gjithashtu mund të fitohet kruarja e lëkurës dhe puqrra. Man kan bli tröttare, få ont i magen och bli illamående. Dessa besvär går oftast över. Man kan också få klåda i huden och utslag.
	Nëse ke shumë telashe duhet të kontaktosh me infermierën në qendrën pranuese për një vlerësim. Om du får mycket besvär ska du ta kontakt med sjuksköterska på mottagningen för bedömning.
	Është me rëndësi të hani mëngjes cdo ditë. Atëherë rreziku do të jetë më i vogël për dhimbje në stomak dhe mundim nga medikamentet. Det är viktigt att äta frukost varje dag. Då är det mindre risk att du får ont i magen och blir illamående av medicinerna.

Pediatri • Barnmedicin

Kontrollat

Kontroller

	Vizitë tek infermierja pas 2 javësh; analizë të urinës dhe të gjakut Besök hos sjuksköterska efter 2 veckor; urinprov och blodprov
	Vizitë tek infermierja pas 6 javësh; analizë të urinës dhe të gjakut Besök hos sjuksköterska efter 6 veckor; urinprov och blodprov
	Vizita përfundimtare te mjeku pas trajtimit 3 mujor. Avslutande besök hos läkare efter 3 månaders behandling. Mjeku yt quhet Din läkare heter
	Mund të na telefonosh në nr e tel.....nëse ke pyetje apo ndonjë problem. Du kan ringa oss på telefonnummer..... om du har frågor eller problem.
	Nëse papritmas merr kollitje të fortë, temperaturë, humbje apetiti apo humbje peshe duhet të paraqitesh tek ne. Om du plötsligt får mycket hosta, feber, aptitlöshet och vikttnedgång ska du höra av dig till oss.