



Information till dig som har opererats för höftfraktur

Höftfraktur

Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften.

Namn:.....

Operationsmetod:.....

Operationsdag:.....

Operationsläkare:.....


Patientansvarig läkare:.....

Arbetsterapeut:.....

Fysioterapeut:.....

Operationsmetod

Operationsmetoden varierar och bestäms efter typen av höftfraktur.



Din fraktur är opererad med:

- en märgspik (1)
- metallplatta och skruvar (2)
- två spikar genom lårbenshalsen (3)

Medicinering

Smärtan efter en höftfrakturopoperation är individuell. Är du bra smärtlindrad har du lättare för rehabiliteringen, därför är det viktigt att du säger till om du har ont.

Grunden i smärtlindringen är någon form av läkemedlet paracetamol (t.ex. Alvedon och Panodil). Den första tiden används dessutom starkare smärtmedicinering som tillägg till paracetamol. För att förhindra blodpropp ges under fyra veckor ett blodförtunnande läkemedel som en injektion.

Kontrollröntgen

Efter operationen görs en kontrollröntgen.

Nutrition

Det är viktigt att äta och dricka ordentligt då det främjar läkeprocessen. Som komplement finns näringsdrycker i olika smaker att tillgå.

Rehabilitering

På avdelningen arbetar vi i team för att du ska få en så bra rehabilitering som möjligt. Träning görs tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och avdelningens vårdpersonal. Alla tillfällen under dagen är träningsmoment.

Efter operationen är det viktigt att komma igång så snabbt som möjligt för att undvika sänklägeskomplikationer såsom lunginflammation och blodpropp. Ditt ben håller att stå och gå på direkt efter operationen förutsatt att bedövningen släppt. Undantag finns och då meddelas du detta. Efter operationen får du hjälp att påbörja gångträning, oftast med gåbord. När du känner dig starkare får du tillsammans med fysioterapeuten byta till annat gånghjälpmedel såsom rollator eller kryckkäppar, som du får med dig hem vid utskrivning.

På avdelningen kommer du att påbörja träningen för att så självständigt som möjligt klara toalettbesök, hygien och påklädning.

Det är viktigt för tillfrisknandet att vara uppe så mycket som möjligt. Att gå till toaletten, sitta uppe vid matbord till måltider och gå promenader i korridoren är därför en viktig del av träningen. Du bör använda lämpliga skor med hälkappa som sitter stadigt på fötterna, då detta underlättar gångträningen.

På- och avklädning

Du kan behöva använda griptång och strump-pådragare för att klara på- och avklädning av byxor och strumpor eftersom det kan göra ont i höften när du böjer dig ned. Arbetsterapeuten visar hur du använder dessa hjälpmedel. Träningen fortsätter sedan på egen hand med stöttning av avdelningens personal.

Tips!

Vid *påklädning*, börja alltid med det opererade benet.

Vid *avklädning*, börja med det icke opererade benet.



Påklädning med strump-pådragare.



Ta av strumpa med griptång.



Påklädning med griptång.

Liggande träning

Utför detta program 2–3 gånger dagligen. Upprepa varje övning 10 gånger. Fottrampet genomförs oftare.



Trampa med foten uppåt/ nedåt så långt det går.



Pressa knäet mot sängen genom att spänna lårets framsida. Håll kvar 5 sekunder.



Dra foten längs madrassen så långt det går, sträck sedan tillbaka benet. Byt ben.



För ena benet ut åt sidan. För sedan sakta benet åter till mitten och byt ben.



Rulle under knäna. Spänn lårets framsida så att hälen lyfter och foten kommer upp. Sänk sakta ned. Byt ben.



Sätt i båda fötterna i sängen. Lyft rumpan långsamt. Håll 5 sekunder, sänk sakta. Använd båda benen lika mycket.

Trappgång med kryckor



Uppför

Håll kryckan i ena handen och ta tag med den andra i ledstången. Kliv upp med det friska benet först, därefter det opererade benet och kryckan.



Nedför

Håll kryckan i ena handen och ta tag med den andra i ledstången. Kliv ned på steget med kryckan och det opererade benet först, därefter det friska benet.

Förberedelse för utskrivning

Vårdtiden efter en höftfraktur är individuell. Det är bra att i god tid börja planera utskrivningen. Oftast behöver man i början mer hjälp än tidigare. För att du ska få den hjälp du behöver efter utskrivning från sjukhuset tillfrågas du om kontakt ska tas med din hemkommun för en planeringsträff. Det innebär att du tillsammans med kommunens representant planerar vilken hjälp som kan behövas efter utskrivning. För att kommunen ska hinna ordna rätt form av hjälp tas denna fråga upp till diskussion relativt snart efter operationen.

Hjälpmedel

För att underlätta uppresning kan du behöva förhöjningshjälpmedel hemma såsom toalettförhöjning, förhöjningsdyna och sängförhöjning. Du kan även behöva badkarsbräda/duschpall.



Arbetsterapeuten på avdelningen tar vid behov kontakt med arbetsterapeut utanför sjukhuset så att du får låna hjälpmedel.

För att lättare komma fram med ditt gånghjälpmedel kan du behöva möblera om i hemmet.

Utskrivning

Den korta vårdtiden på sjukhuset innebär att du inte är färdigtränad när du skrivs ut. Du får besked vid utskrivningen om hur uppföljning och fortsatt träning kommer att ske.

Vid utskrivningen får du av läkaren en skriftlig sammanfattning av din vård och vilka läkemedelsändringar som är gjorda. Oftast behövs inget återbesök till läkare, men vi skickar en sammanfattning av sjukhusvistelsen till din vårdcentral.

Om du ska ta injektioner av blodförtunnande läkemedel kan du få hjälp med detta av hemsjukvården eller vårdcentralen. I vissa fall kan man också lära sig att ta dem själv.

Om du har fått hjälpmedel under vårdtiden – kom ihåg att ta med dem hem.

Bilåkning

Använd gärna passagerarsätet fram. För sätet så långt bak det går och fäll ryggstödet bakåt. Sätt dig på sätet och luta dig bakåt och lyft in båda benen.

När du kommer hem

Agrafferna (det man har häftat ihop operationssåret med) kommer att tas bort av disktriktssjuksköterskan på din vårdcentral eller av hemsjukvården. Detta sker ca två veckor efter operationen. Om du ska ta bort dem på vårdcentralen behöver du själv boka en tid.

Försök att vara aktiv för att påskynda återhämtning och läkning av frakturen. Ett bra sätt att återhämta sig efter en höftfraktur är att komma igång med vardagliga aktiviteter.

Det är viktigt att belasta skelettet. Muskelstyrkan behöver byggas upp vilket stärker skelettet.

Om du får ökad hjälp av hemtjänst eller anhöriga när du kommer hem – försök att så småningom bli mer oberoende av denna hjälp.

Anteckningar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Den här broschyren vänder sig till dig
som har ramlat och brutit höften.
Här får du information om bl.a.
rehabilitering, trappgång,
hjälpmedel och förberedelser
inför utskrivningen.

Kungälvssjukhus
442 83 Kungälv
Tfn 0303-980 00
www.vgregion.se/ks