

Åderbråck

– injektionsbehandling



Diagnos och symtom

Åderbräck är en försvagning av de ytliga ådrorna (venerna) som ska föra blodet från benet upp mot hjärtat. Försvagningen gör att ådran vidgar sig på ett eller flera ställen. Arv, hormoner och graviditet kan vara bidragande orsaker.

Åderbräck är inte farligt, men om man har haft åderbräck i många år ökar risken för svullnad och sår på benen. Detta kan man förebygga med stödstrumpor.

Behandling

Injektionsbehandling innebär att ett lätt kärlretande läkemedel injiceras i åderbräcket. Detta leder till bildning av ofarliga småproppar och att kärlet stänger sig. För att minimera effekten av läkemedlet utanför det behandlade kärlet sätts ett tryckförband, en elastisk binda eller strumpa över hela benet.

Eftervård

Kompresserna för det lokala trycket avlägsnas dagen efter behandlingen, medan strumpan ska användas dygnet runt i en vecka och därefter dagtid i ytterligare en vecka.

Efter behandlingen

De små propparna kan kännas som hårdare kulor 3–4 månader efter behandlingen.

Detta är helt ofarligt. Ibland kan en lätt brunaktig missfärgning uppstå efter behandlingen. Det beror på en utfällning av järn från blodet. Denna försvinner inom det närmaste halvåret.

Undvik att sola de behandlade hudpartierna då solen kan göra att det uppstår en brunaktig missfärgning. Om du vistats i solen är det bäst att sätta en tejpbit över injektionsstället.

Du kan röra dig normalt efter behandlingen och återgå till arbete, men undvik tung fysisk aktivitet de närmaste dagarna.

Kungälvssjukhus, 442 83 Kungälv
Besöksadress:
Lasarettsgatan, Kungälv
Tfn 0303-980 00
www.vgregion.se/ks