

ናይ ከብድን፤ መዓናጡን፤ጸላም ከብድን መቐበሊ • Mag-tarm-levermottagning

መግቢ ብመልጎም ምሃብ

Matning via knapp



መግቢ ቅድሚያ ምኽሻን ምጅማርካ ኣእዳውካ ትሕጸብ ከምኡእውን ንሕጻን ክትምግብ እንከለኻ።

እቲ ፈሳሲ መግቢ ምዉቕ ወይ ውዕይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ።


Tvätta händerna innan du gör i ordning maten och innan du matar barnet. Näringslösningen ska vara rumsvarm eller lite varmare.



ቁሩብ መግቢ ንሕጻን ምእንቲ መቐረት ጣዕሚ ንክስምዖ ትህብ።

እንተድኣ እቲ ሕጻን ንምውሓጥ ጸገማት ምስዘጋጥሞ ምስ ኣላይት ሕሙማት ትዘራረብ።


Ge lite mat i munnen så att barnet får en doft- och smakupplevelse. Om barnet har svårt att svälja ska det ske i samråd med sjuksköterska.



ነታ ሻምበቆ ብፈሳሲ መግቢ ትመልኣ።

ነታ ሻምቡቆ መግቢ ምስ መልጎም ተላግባ፤ ብድሕርዚ ንሕጻን ትምግብ።

Fyll hela matslangen med näringslösning. Koppla matslangen till knappen och mata barnet.



ብድሕሪ መግቢ መልጎምን፤ሻምቡቆ መግብን ብማይ ብ3 ክሳብ 10 ሚሊሊተር ገርካ ተጽርዮ።

Efter matningen ska knapp och matslang spolas igenom med minst 3-10 ml vatten.




ነቲ ቱቦ ካብ መልጎም ትኣልዮ።

Ta bort slangen från knappen.

ናይ ከብድን፤ መዓናጡን፤ጸላም ከብድን መቐበሊ • Mag-tarm-levermottagning


መግቢ ብመልጎም ምሃብ

Matning via knapp



መጀመርያ ንሻምቡቕ ብዝሒል ማይ ትልቕልቕ፤ብድሕርዚ ድማ ብዉዑይ ማይ (60 ዲግሪ) ኣብ መጨረሻታ ድማ ብዝሒል ማይ ትሓጽብ።


Spola först igenom slangen med kallt vatten och sedan med varmt vatten (60 grader) och till sist med kallt vatten.



ነቲ ሻምቡቕ ኣብ ሓደ ሳጹን ከዲንካ ኣብ መዝሐሊ ተቐምጦ።

ንሻምቡቕ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ትቕይር።

Förvara slangen i en burk med lock i kylskåpet.
Byt slang varannan vecka.



ኣስናን ናይ ሕጻን ምሕጻብ ዘይምርሳዕ፤ኩሉ ግዜ ናይ ሕጻን ከናፍር ብፈሳሲ ወይ ብማይ ጌርና ንለኽዮ።

Glöm inte att borsta barnets tänder.
Fukta eller smörj barnets läppar regelbundet.



መድሃኒት ብፈሳሲ ክወሃብ ኣለዎ፤

ከኒና ይጥሓንን ወይ ድማ ኣብ ማይ ተበጽቢጹ ይወሃብ።

Läkemedel ska ges i flyttande form.
Tabletter ska krossas noga eller lösas upp i vatten.