

Influensa, antiviral terapi till vuxna

Terapigrupp Infektion har tagit fram ett utvidgat terapiråd om antiviral terapi till vuxna vid influensa.

I terapirådet betonas att antiviral terapi med oseltamivir ska övervägas för alla patienter som sjukhusvårdas för misstänkt influensa, även om riskfaktorer för allvarlig sjukdom saknas och om mer än 48 timmar förflutit sedan influensadebut.

Första dosen är alltid 75 mg oberoende av njurfunktion.

Behandling och profylax rekommenderas alltid vid graviditet oavsett graviditetsvecka om ytterligare riskfaktor föreligger, men kan övervägas även hos för övrigt friska gravida.

[Terapirådet](#) finns på [terapigruppens hemsida](#)

För terapigrupp Infektion
Gunnar Jacobsson ordförande, överläkare

Ulrika Eriksson Krebs
sekreterare, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Peter Amundin
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén

Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt till:

- **Regionala läkemedelsgruppen - för vidaredistribution till berörda verksamheter**
- Verksamhetschefer och kontaktpersoner för läkemedel inom Vårdval Vårdcentral

Nyhetsbrevet finns även på www.vgregion.se/lakemedel/nyhetsbrev